

Aus der Univ. Hautklinik Erlangen. Vorstand: Prof. Dr. Leo Hauck.

Ein Beitrag zu den chronischen Pyodermien der Haut.

2 Fälle

von *Pyodermia chronica papillaris et exulcerans*.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der Doktorwürde
einer Hohen Medizinischen Fakultät
der Friedrich-Alexanders-Universität zu Erlangen

vorgelegt von

Otto Scheider

aus Ansbach.

Tag der mündlichen Prüfung: 17. Januar 1936.

Buchdruckerei Robert Windsheimer, Erlangen-Bruck.

1936

Referent: Professor Dr. med. L. Hauck.
Dekan: Geheimrat Prof. Dr. Fr. Jamin.



Die chronischen Pyodermien in der engeren Fassung des Begriffes, d. h. die Fälle von unterminierender Eiterung mit eigenartiger papillomatös verrucös wuchernder Narbenbildung, finden sich im Schrifttum in den ersten Jahren dieses Jahrhunderts erstmalig in den Arbeiten von Bosselini und Anthony veröffentlicht. Als Krankheitsbild, das in seinen Grundzügen diesem Gebiet nahe steht, besteht allerdings schon seit 1869 die *Dermatitis papillaris capillitii Kaposi*.

Bis in die Mitte des letzten Jahrzehnts sind dann eine ganze Reihe von Demonstrationen und Arbeiten über hierher gehörige Fälle zu verfolgen, die jedoch infolge Fehlens gültiger gemeinsamer Gesichtspunkte unter dem jeweiligen Befund möglichst angepaßter verschiedenartiger Bezeichnung angeführt werden. Die bis heute noch bestehende teilweise Unklarheit über Ursache und Wesen der eigenartigen wie vielformigen Hautkrankheit hat im Verein mit der Fülle der Namen ein ziemliches Wirrwarr von Begriffen und Theorien entstehen lassen. Bestrebungen nach einer geordnet zusammenfassenden Betrachtungsweise führten erst im Verlauf des letzten Jahrzehnts zu brauchbaren Teilergebnissen. Wurde auch eine Einheitlichkeit der Ansichten noch nicht erzielt, so konnte doch eine Reihe von Gesichtspunkten für die Betrachtung derartiger Krankheitsbilder schärfer umrissen und dadurch der weiteren Forschung der Weg zur Erzielung von in diesem Sinne verwertbaren Resultaten gezeigt werden. In Verfolgung dieser Richtlinien wurde von Zurhelle und Klein unter der von E. Hoffmann geprägten Bezeichnung „*Pyodermia chronica papillaris et exulcerans*“ ein Krankheitsbild abgegrenzt, das — ungeachtet mancher noch ungeklärter Grundlagen — wesentliche übereinstimmende Merkmale bietet.

Von der Hautaffektion befallen erscheinen meist Individuen von schwächlicher Konstitution und mäßigem bis reduziertem

Ernährungszustand, wobei das männliche Geschlecht stark überwiegt. Übereinstimmend wird die Beschäftigung in ländlichen Betrieben, bei Erdarbeiten überhaupt oder doch in Berufen, die in anderer Weise die Intaktheit und Sauberkeit der Haut gefährden, als begünstigendes Moment angesprochen. Im Zusammenhang damit steht der mehrfach beschriebene Ausbruch der Affektion im Anschluß an eine meist geringe Verletzung oder doch die Annahme von außen her vorbereitend einwirkender Hautschädigungen. Das Lebensalter zeigt keine annähernde Konstante. Für das Krankheitsbild selbst wird eine umschriebene besondere Lokalisation nicht gefordert, doch scheint einen bevorzugten Sitz der Handrücken zu bilden.

Das Aussehen der in Ein- und Mehrzahl herdförmig auftretenden Erscheinungen ist nach Ausdehnung wie Verlauf verschieden. Der ausgebildete Pyodermieherd imponiert übereinstimmend als markstück- bis handflächengroßer Bereich höckerig-warziger Haut mit mehr oder weniger massigen Krustenauflagerungen auf der eigenartig schwammig-porösen Hautdecke. Unter Druck auf diese Decke kommt es zu siebartigem Austritt von eitrig flüssiger oder breiiger Substanz aus vielen feinen Öffnungen. Daneben finden sich narbige Stadien des Prozesses von teils ausgeprägt papillomatös verrucöser Beschaffenheit, teils von gestricktem Aussehen mit kolbigen Auflagerungen und Hautbrücken beschrieben, aus deren unterminierter Decke vielfach talgig breiige Massen ausgepreßt werden können.

Die histologischen Untersuchungen, mögen sie eine völlige Einheitlichkeit auch vermissen lassen, zeigen übereinstimmend Parakeratose, Wucherung des Epithels in allen Graden bis zum strangartigen Vordringen in die Tiefe der Cutis. Die Zellenvermehrung geht bis zur klumpigen, epitheliomähnlichen epidermalen Wucherung, zeigt jedoch nie infiltrierendes Fortschreiten malignen Charakters. Im Cutisbereich tritt die auffallende Erweiterung der Lymphbahnen neben dem Bestehen eines unspezifischen Granulationsgewebes hervor, dessen Zusammensetzung neben Lymphozyten und Plasmazellen in mehreren Fällen Riesenzellen und vereinzelt epitheloide Bestandteile kennzeichnen. Endlich finden sich in der Cutis Höhlenbildungen wie bei cutanen Abscessen. Die umstrittenen Veränderungen an den Follikeln

bestehen im wesentlichen aus einem folliculären und perifolliculären Infiltrat neben Hornstauung im Follikel, der vielfach den Ausgangspunkt der in die Tiefe wuchernden Epithelstränge darstellt.

Auf die Tatsache, daß die *Pyodermia chronica papillaris et exulcerans* Fälle folliculären wie nicht folliculären Aufbaues umfaßt, wird im späteren noch einzugehen sein.

Die bakteriologischen Resultate stimmen überein in dem Nachweis von Staphylococcen oder Streptococcen. Im einzelnen wurden vorwiegend hämolytische Staphylococcen (*Staphylococcus aureus pyogenes hämolyticus* oder *Staphylococcus albus hämolyticus*), seltener hämolytische Streptococcen, nur vereinzelt der *Streptococcus viridans* gefunden. Ihre Rolle als Erreger der Affektion hat angesichts des Fehlens anderer Ursachen wenn auch nicht Gewißheit, so doch große Wahrscheinlichkeit erhalten, die Art ihrer Wirksamkeit ist noch ziemlich fraglich. Mehrfach angestellte Versuche zur Feststellung der Virulenz lauten in ihren Resultaten, unter kritischer Beurteilung ihrer Verwertbarkeit, ziemlich gleich und lassen einen nur mittelmäßigen Virulenzgrad annehmen.

Gleiche Bestimmungen an physiologisch auf und sogar innerhalb der Haut vorkommenden Coccenarten sind im Prinzip widerspruchsvoll. Während Michael und Neisser durch eine Reihe von Kennzeichen die Pathogenität und Virulenz bestätigt sehen, unterstreicht Hilgers die stetigen Schwankungen letzterer und teilt die Hautkeime in drei ineinander übergehende Stadien (Anflugs-, Haft- und Invasionskeime) ein. Für die praktische Betrachtung ergibt sich immerhin in jedem Falle das Vorkommen virulenter Coccenarten auf und in der gesunden Haut neben dem allgemein gelungenen Nachweis gleicher Coccenarten aus den Pyodermieherden.

Da die bakteriologischen Untersuchungen die Ätiologie des Krankheitsbildes noch nicht endgültig zu sichern vermochten, wird die Stellung der Diagnose umso mehr von eingehendster Erschöpfung aller differentialdiagnostischen Möglichkeiten abhängig gemacht. Die geradezu vollendete Übereinstimmung des klinischen Bildes der chron. Pyodermie mit dem von Hauttuberculojen (*Tuberculosis cutis verrucosa* oder auch *Lupus vulgaris*),

Lues-Formen, Blastomycose, Jododerm und Bromoderm erschwert die Erfüllung dieser Forderung. Die beiden letztgenannten Krankheitsbilder konnten wohl jeweils noch rein anamnestisch ausgeschlossen werden, alle übrigen dagegen waren nur durch ausreichende Untersuchungen histologischer wie bakteriologischer Art mit Sicherheit von den chronischen Pyodermien abzugrenzen.

So ergaben in solchen Fällen angelegte Hefekulturen vereinzelt (Tschernoguboff) Wachstum von auf der Haut physiologisch vorkommenden Hefearten. Tschernoguboff betont die Bedeutungslosigkeit eines solchen Nachweises und warnt vor der Annahme einer Mycose auf Grund von Zufallsbefunden.

Die Trennung der Pyodermiefälle von Pilzkrankungen geschah durchwegs durch eingehende mikroskopische Untersuchungen, darüber hinaus wurden von verschiedenen Seiten Cutanreaktionen mit Pilzextrakten mit negativem Ergebnis durchgeführt. Ebenso negativ verliefen hier die dem Nachweis einer Lues dienenden serologischen Methoden nach Wassermann, Meinicke, Kahn u. a.

Eine positive Tuberculin-Cutanreaktion nach Pirquet fand sich lediglich bei einigen „acne-conglobata-ähnlichen“ Fällen H. Hoffmanns im Zusammenhang mit nachgewiesenen Organtuberculosen.

Tierversuche beschäftigten sich zunächst mit weiterer Sicherung der Diagnose gegenüber den Pilzkrankungen und der Tuberculose. Zurbelle und Klein berichten von negativ verlaufenen Impfungen an fünf Fällen, wobei Eiter Ratten und Meer-schweinchen unter die Bauchhaut gebracht worden war. Kumer hat Versuche in Form von Einreibungen in die skarifizierte Haut angestellt, die auch auf menschliche Haut ohne positives Ergebnis ausgedehnt wurden.

Aus den negativen Ergebnissen aller differentialdiagnostischen Untersuchungen und Erwägungen ergibt sich, unterstützt durch den aber nur eingeschränkt verwertbaren Nachweis eiterbildender Coccen, die Diagnose.

Es wurde einleitend schon betont, daß ein Versuch, die in ihren Grundzügen übereinstimmenden chronischen Pyodermien unterzuteilen heute endgültig noch nicht möglich erscheint. Tat-

fächlich ergibt die Betrachtung lediglich ein unterschiedliches Überwiegen von lokalisatorischen oder symptomatischen Momenten einzelner durch die Form der Diagnose äußerlich voneinander getrennter Krankheitsbilder.

So tritt in einer Reihe derselben der vegetierende Charakter gegenüber der Abszedierung und Exulceration in den Vordergrund, ebenso besteht auch das umgekehrte Verhältnis. Wie fraglich diese von Ruiter scharf gezogene Grenze an sich wird, zeigt die *Pyodermia chronica papillaris et exulcerans* als ausgesprochene Mischform, wenn auch in manchen Fällen zur ulcerösen Seite neigend.

Der Versuch einer Trennung oberflächlicher, also auf die Epidermis beschränkter Fälle von den die Cutis mitbeteiligenden, hat ebenfalls gewisse Unklarheiten nicht vermeiden können. Als Beispiel diene ein von Dammann als oberflächliche Form veröffentlichter Fall, dessen mikroskopischer Befund eine, wenn auch als sekundär betonte Mitbeteiligung der Cutis feststellte.

Das von Tachau für eine Trennung als ausschlaggebend geforderte Verhalten der Follikel endlich, steht der Tatsache gegenüber, daß in den Fällen von Zurhelle und Klein wie Kumer der folliculäre neben dem nichtfolliculären Typus steht, d. h. daß die Entzündung von den Follikeln ihren Ausgang nimmt oder nicht, Ruitters Arbeiten aus der Groninger Schule (Zurhelle) lehnen denn auch eine derartige Trennungslinie ab.

Der Zweck dieser Gegenüberstellungen soll sein, die gemeinsame Brücke zu zeigen, die von der rein vegetierenden zur ulcerösen, von der oberflächlichen zur tiefen, von der folliculären zur nichtfolliculären Form führt. Diese Fragestellung für eine zweckmäßig einheitliche Eingliederung der einzelnen Krankheitsformen wollen wir im folgenden im Auge behalten. Sie hat ja letzten Endes dazu geführt, daß eine große Zahl von oft äußerlich unterschiedlichen Bezeichnungen in das Schrifttum gelangte, bis es möglich wurde, nach dem zunächst Trennenden doch das Gemeinsame herauszufinden.

Bosselinis verrucöse Dermatitis der unbedeckten Körperteile, wie erwähnt die zuerst beschriebene in unser Krankheitsbild ein schlägige Form, betont den überwiegend vegetierenden Charakter in Gestalt der papillomatösen Wucherungen. Der histologische

Befund kennzeichnet die typische Epithelwucherung neben dem unspezifischen Infiltrat der chronischen Entzündung. Ihr nahe steht die *Perifolliculité suppurée et conglomerée en plaques* Leloir mit allerdings schon deutlichen Zeichen einer Abscedierung. Auch die kleinpußtulös vegetierende Dermatose Fischels ist hier zu nennen.

Der Uebergang zur exulcerierenden Form vollzieht sich in einem nach Vegetation und Ulceration abgestuften gemischten Verhältnis.

Eine, dem histologischen Befund nach betrachtet, rein ulceröse Form ist ein eigentlich in keinem Falle reiflos erfüllter Begriff.

Die im Schrifttum vorhandenen Fälle vegetierender und zugleich exulcerierender Pyodermien sind von einer Reihe von Autoren im Anschluß an die Arbeiten von Zurhelle und Kumer unter der ihrem Bild gerecht werdenden Bezeichnung „*Pyodermia chronica papillaris et exulcerans*“ veröffentlicht. Neben diesen findet sich eine Anzahl anderer, die nach dem klinischen Bilde tatsächlich auf gleicher Stufe stehen, in der Benennung jedoch von den obigen äußerlich abweichen.

Tischernoguboff bringt im Rahmen seiner Arbeit über chronische Pyodermien einen derartigen Fall unter der Bezeichnung „chronisch vegetierende Pyodermie“, der eine diffuse Ausfaat von Herden im Sinne der *Pyodermia chronica papillaris et exulcerans* darstellt. Als Vergleich können Zurhelles Fall V und Kumers Fall XI dienen. Die in der Diagnose den folliculären Charakter betonenden Fälle von Lucasiewicz (*Folliculitis exulcerans*), Bizzozzero (*Folliculitis et Perifolliculitis ulcerans serpiginosa*), Huber (*Perifolliculitis suppurativa et ulcerans*) fügen sich neben der äußeren Erscheinungsform histologisch wie bakteriologisch völlig in den vorgezeichneten Rahmen ein. Bizzozzero leitet mit der Beschreibung flächenhafter Narben mit eitrig unterminiertem bogenförmigem Wall zur ulcerösen Form unseres Krankheitsbildes über, seine Abbildungen kennzeichnen augenfällig die vielfach beschriebene serpiginöse Frontlinie des Pyodermieherdes.

Aus weiteren Arbeiten von van Leeuwen (*Pyodermia chronica ulcerosa*), Mrongovius (Zur Frage der chronischen Pyodermie), Tischnenko und Kroicik (Zur Frage der *Pyodermia chronica*

serpiginosa), Carol (Merkwürdiger Fall von *Pyodermia chronica papillaris et exulcerans*) unterscheiden sich die Krankheitsbilder nicht irgendwie grundlegend von der chronischen *Pyodermie* E. Hoffmanns. Beachtung verdient der Fall Carols zur Kennzeichnung der Schwierigkeiten der Differentialdiagnose, die bei seiner Kranken nach dem klinischen Befund (fortschreitende Ulceration der Mamma) zunächst eher ein Carcinom annehmen ließ als die tatsächlich vorhandene chronische *Pyodermie* und vor der endgültigen Diagnosestellung noch erhebliche Schwierigkeiten bei der Ausschließung luetischer Grundlagen für die vorliegenden Hauterscheinungen hatte. Zur Ergänzung sei auch auf die Veröffentlichung eines eigenartigen Falles durch Dittrich hingewiesen, dessen auf Grund des klassischen klinischen Bildes gestellte Diagnose einer chronischen *Pyodermie* erst nach dem Nachweise von Tuberkelbazillen in einem Kniegelenkspunktat der eines serpiginösen *Lupus vulgaris* weichen mußte.

Die unter der E. Hoffmannschen Diagnose im Schrifttum aufgeführten chronischen *Pyodermien* zeigen Ulceration neben Vegetation. Mag auch in einzelnen Fällen die Wucherungstendenz im Gesamtbild stark zurücktreten, so berechtigt dies doch noch nicht zur Feststellung rein ulceröser Formen. So läßt auch die Durchsicht der Fälle von Zurhelle und Klein, Kumer sowie Glauber son, Kogoj, Dohi u. a. nach dem histologischen Befund ein völliges Fehlen der Gewebswucherungen nicht erkennen. Sollte man diese Fälle als rein ulceröse Formen bezeichnen, so würde das Grundbild dadurch teilweise verwischt und in seiner Beziehung zu nahestehenden Krankheitsformen verändert. Außerdem verlief eine derart gezogene Trennungslinie z. B. durch die gesammelten Fälle von Zurhelle und Klein sowie Kumer, was den Abhandlungen der Erwähnten durchaus widerspräche und was Ruiter selbst in seiner engen Anlehnung an Zurhelle widerspricht.

Die Unterteilung nach Ausdehnung des Gewebsdefektes im Hautquerschnitt in oberflächliche und tiefe Formen sucht eine Trennung der lediglich den epithelialen Teil der Haut erfassenden von der auch in die *Cutis* einbrechenden Gewebszerstörung durchzuführen.

Ruiter führt als oberflächliche chronische *Pyodermien* die

Fälle von Tišhnenko und Kroicik, Dammann und Hagen an. Die Durchsicht der drei Arbeiten ergibt das Resultat, daß Tišhnenko und Kroicik ihre drei Fälle weder von sich aus als oberflächliche Formen betrachtet wissen wollen, noch in der Art ihrer Befundberichte dazu Anlaß geben. Dammanns Bezeichnung „*Pyodermia chronica serpiginosa superficialis ulcerativa*“ enthält an sich schon einen nicht auszugleichenden Widerspruch. Der Begriff des Ulcus kennzeichnet nach seiner feststehenden Definition eine Mitbeteiligung der Cutis durch den Zerfallprozeß. Findet ein solcher lediglich in den epithelialen Schichten der Haut statt, so bezeichnet man den so entstehenden Gewebsdefekt als Erosion. Durch den Zusatz „*ulcerativa*“ kennzeichnet Dammann für seinen Fall die Mitbeteiligung der Cutis, was dem histologischen Befundbericht nach tatsächlich zutrifft, wenn auch nur an einzelnen Stellen. Daß in der überwiegenden Zahl der Schnittbilder die Grenze der Epidermis von der Gewebszerstörung nicht überschritten wird, darf dann nicht dazu führen, von ausschließlich oberflächlicher Form zu sprechen.

Hagen veröffentlicht seine drei Fälle als erosive chronische Pyodermien, gibt jedoch für Fall III das Bestehen von echten Ulcerationen selbst zu. In dem Befund der beiden ersten sind solche zwar nicht zu erkennen, doch ist die Cutis in gleicher Weise wie bei den tiefen Formen entzündlich infiltriert. Es erscheint doch recht fraglich, ob solche Fälle auf Grund von doch nur ausschnittweise durchgeführten histologischen Untersuchungen als grundsätzlich nur das Epithel zerstörende Sonderformen gekennzeichnet werden dürfen.

Damit entfallen die von Ruiter als — dem Sinne nach — rein erosiv gewerteten Fälle schon von sich aus für diese Betrachtung. Darüber hinaus geht Ruiter, ebenso wie Dammann, von falschen Grundlagen aus, wenn er die „ulcerösen“ Pyodermien noch in oberflächliche und tiefe Formen einzuteilen versucht, indem auch er das Wesen der Ulceration verkennt.

Die Verfolgung seiner Absicht könnte nach dem Vorhergegangenen höchstens zu einer Gegenüberstellung von vorwiegend erosiven gegenüber vorwiegend ulcerösen chronischen Pyodermien führen, die damit erzielte Einteilungsmöglichkeit ist allerdings von fraglichem Wert.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß die eben be-

beschriebenen Versuche einer einheitlichen Ordnung des vorliegenden Materials bis heute noch keine befriedigende Lösung erbracht haben. Die verhältnismäßig geringe Zahl verwertbarer Fälle bietet eine noch ungenügende Grundlage.

Die nachfolgende Betrachtung von zwei scharf umschriebenen Krankheitsbildern in ihrer Beziehung zur *Pyodermia chronica papillaris et exulcerans* schneidet ebenfalls noch umstrittene Fragen an.

Die *Folliculitis et Perifolliculitis capitis suffodiens et abscedens* E. Hoffmann wird auf Grund ihrer in vielen Punkten engen Übereinstimmung in diesem Zusammenhang allenthalben erwähnt. Von den folliculären Formen der chronischen Pyodermie trennt sie an sich nur die streng geforderte Lokalisation auf dem behaarten Kopf. Das Krankheitsbild selbst mit der vom entzündeten Follikel ausgehenden Epithelwucherung und der fistelnd-unterminierenden chronischen Eiterung staphlogener Art wie der histologische Befund zeigen enge Übereinstimmung mit den folliculären chronischen Pyodermien. Die Fälle nichtfolliculärer Art rücken dementsprechend weiter ab.

Wenn man die Beteiligung des Follikels für die Beschreibung des Krankheitsbildes zum ausschlaggebenden Faktor machen will, so würde eine abermalige Trennung der gesammelten Fälle Zurhelles und Kleins sowie Kumers sich ergeben. Es würde dann nach Taschau die *Perifolliculitis capitis suffodiens et abscedens* E. Hoffmanns als gesondertes Krankheitsbild neben den Fällen von Lucasiewicz, Leloir, Bosselini, Huber u. a. sowie einzelner Fälle von *Pyodermia chronica papillaris et exulcerans* (Zurhelle, Klein und Kumer) stehen.

Ohne Beziehung zur E. Hoffmannschen Krankheit ständen die nichtfolliculären Fälle von Zurhelle, Klein und Kumer, sowie die von Tschernoguboff u. a.

Nun zeigen aber die durch ihre Mehrzahl besonders gut vergleichbaren Fälle der drei eben erwähnten Autoren ungeachtet des nicht einheitlichen Verhaltens des Follikels eine derartige Übereinstimmung in allen übrigen Grundzügen, daß eine Trennung nur nach diesem einen Gesichtspunkt dennoch nicht berechtigt erscheint. Die Beziehung der Fälle von Zurhelle zur *Perifolliculitis capitis suffodiens et abscedens* wird durch diese Stellungnahme nicht aufgehoben. Letztere Erkrankung muß wohl

in ihrer fest umrissenen Sonderstellung auch den folliculären Pyodermien gegenüber unangetastet bleiben, wenn nicht eine neue Unklarheit entstehen soll. Die Fälle Mohrmanns, besonders sein Fall II, sind nach ihrem Befund durchaus in die Gruppe der *Pyoderma chronica papillaris et exulcerans* einzureihen, während Köhler, auf den Mohrmann sich beruft, seinen Fall dem Krankheitsbild Hoffmanns angliedern kann. Auch abgesehen von der folliculären Beteiligung am klinischen Bild bestehen zwischen den eben erwähnten Krankheiten soviel Ähnlichkeiten in Form, bakteriologischem und auch noch histologischem Befund (unterminierend fistelndes Fortschreiten subepitheliale Abscesse, unspezifisches entzündliches Cutisinfiltrat), daß eine Beziehung wesentlicher Art voll aufrecht erhalten bleibt, eine Vermengung andererseits abgelehnt werden muß.

Weiter entfernt sich von den chronischen Pyodermien die *Dermatitis papillaris capillitii* Kaposi. Dieses, wie erwähnt, seit langer Zeit feststehende Krankheitsbild weist eine unbedingt eigenartige keloidähnliche Narbenbildung auf, wie sie der *Pyoderma chronica papillaris et exulcerans* nur entfernt ähnlich in einzelnen Fällen zu eigen ist.

Ihre Ätiologie (Staphylococcen), der chronische Verlauf und die Wucherungstendenz des Epithels bringt sie der letzteren nahe, doch fehlt gegenüber der E. Hoffmannschen Erkrankung das unterminierend fistelnde Vordringen der Eiterung im Hautbereich. Hinsichtlich der Beteiligung des Follikels an den Krankheitsvorgängen gelten die gleichen Einschränkungen wie bei der *Perifolliculitis capitis suffodiens et abscedens*.

Die *acne-conglobata*-ähnlichen Fälle H. Hoffmann sind in ihrer Beziehung zur *Pyoderma chronica papillaris* und den ihr eng verwandten Formen sehr umstritten. Die in der Bezeichnung ausgedrückte Ähnlichkeit mit der *Acne conglobata* kommt in drei Fällen E. Hoffmanns neben der disseminierten Ausaat von Eiterherden in dem Vorhandensein von Comedonen und Acnenarben zum Ausdruck; damit rücken diese Fälle aber auch von der chronischen Pyodermie ab. Wohl lassen die dabei vorkommenden cutanen Abscesse und unspezifischen entzündlichen Infiltrate sowie der Nachweis von Pyococcen einen Vergleich der ebenfalls sehr hartnäckigen, chronischen Hautaffektion mit

der *Pyodermia chronica papillaris et exulcerans* zu, doch bestehen andererseits zu große Verschiedenheiten. Bei keinem Fall von chronischer *Pyodermie* wurden bisher Comedonen oder deren Residuen beschrieben, die als pathognomonisches Zeichen der *Acne conglobata* anzusehen sind. Auf die *Acne*- Grundlage der Fälle H. Hoffmanns weist auch die Schwierigkeit ihrer Abgrenzung von der Tuberculose hin. Es ist wohl kein reiner Zufall, wenn in drei von seinen fünf Fällen eine Organtuberculose bestätigt wurde, mag auch histologisch eine Hauttuberculose nicht vorgelegen haben und mögen Tierversuche negativ verlaufen sein. Sollten sich dennoch weitere ähnliche Krankheitsbilder finden, die keine deutlich nachweisbare Beziehung zur Tuberculose und zur *Acne conglobata* zeigen und selbst durch das Auftreten von Comedonen nicht aus dem Rahmen der hierher gehörigen chronischen *Pyodermien* fallen, so könnte durch Vermeidung des *Acne*-Begriffes in der Bezeichnung vielleicht manche Unklarheit umgangen werden, so selbstverständlich die Ähnlichkeit des Gesamtbildes wie teilweise auch der Einzel-efflorescenzen zu dieser Benennung führen konnte.

Zusammenfassend geht aus den vorhergehenden Betrachtungen hervor, daß für die Reihe der Seite 8 angeführten Krankheitsbilder, ausschließlich der drei letztgenannten, engste Beziehungen unter sich bestehen, die grundsätzlich zu einer weitgehenden Gleichstellung berechtigen. Inwieweit und nach welchen Gesichtspunkten eine Schematisierung dieser eben erwähnten Krankheitsfälle in Frage kommt, soll hier angesichts der mehrfachen, an Mangel des heute vorliegenden Schrifttums noch gecheiterten Versuche nicht zu einer weiteren, noch verfrühten Stellungnahme führen. Die Formen von E. Hoffmann und Kaposi sollen jedoch, ohne in ihren Beziehungen zur vorgenannten großen Gruppe verkannt zu werden, als feststehende Krankheitsbilder einer derartigen Vermengung entzogen werden. Die Fälle H. Hoffmanns sind nach ihrem heutigen Bild noch gesondert zu halten.

Im Folgenden kommen nun zwei Fälle von *Pyodermia chronica papillaris et exulcerans* zur Beschreibung, die in der Hautklinik Erlangen längere Zeit hindurch eingehend beobachtet wurden.

Fall I: Landwirtschaftlicher Arbeiter L. 35 Jahre alt.

Aus der Familienanamnese ist zu entnehmen, daß der Vater des L., 54 jährig, an unbekannter Ursache, die Mutter, 40 jährig, an Wasserjucht gestorben ist. Zwei Geschwister leben, von Krankheiten beider weiß L. nichts zu berichten. Auch eingehende Ausforschung des geistig nicht eben hochstehenden Kranken ergibt keinen Anhaltspunkt für das Bestehen erblich belastender Krankheiten, insbesondere der Tuberculose, in seiner Familie.

Unser Kranker selbst ist ledig. Über früher durchgemachte Krankheiten ist wenig zu erfahren. An Kinderkrankheiten kann er sich nicht erinnern, auch in der Zwischenzeit war er angeblich nie ernstlich erkrankt. Fragen nach charakteristischen Symptomen für Tuberculose, Diabetes, Erkrankungen des Verdauungstraktus haben ein absolut negatives Ergebnis. Seine jetzige Hautkrankheit, die im Jahre 1926 begonnen haben soll, darf aber wahrscheinlich in ihrem ersten Anfängen schon auf das Jahr 1916 zurückverlegt werden, da von diesem Zeitpunkt an eine stetig sich wiederholende Furunkulose an den verschiedensten Körperstellen bestanden haben soll. L. stand mehrfach deshalb in ärztlicher Behandlung, die sich jeweils auf lokale Versorgung beschränkte. Die Furunkel heilten stets gut ab; in Intervallen war er dann völlig frei von Hauterscheinungen. Seine ersten genaueren Angaben fallen in das Jahr 1924, zu welcher Zeit er einen großen Furunkel im Nacken (Karbunkel?) und einen zweiten am linken Unterarm beschreibt. Im Sommer 1925 bestand dann nach seinen Angaben ein Furunkel auf der linken Wange; dazu trat etwa Mitte November 1925 ein eitriger Ausschlag im Bereich der Bartgegend, weshalb der Kranke am 10. Dezember 1925 erstmals zur Aufnahme in die Klinik kam. Die Diagnose lautete: Sycosis non parasitaria, Absceßherd auf der linken Wange. Die neben der örtlichen Behandlung (Alkohol-, eßigsaure Tonerde-Verbände) durchgeführte intravenöse Staphylozytoren-Therapie wirkte günstig auf den Krankheitsprozeß ein. Bei Entlassung bestanden noch einige derbere, leicht gerötete Hautpartien auf der linken Wange. Der übrige Körper war von Hauterscheinungen damals völlig frei, lediglich auf der (stark behaarten) Brust fanden sich einige verstreute Folliculitiden.

Nicht lange nach der Entlassung bildete sich eine neue

eiternde Hautstelle unterhalb des Nabels, die der Kranke von sich aus schon nicht als Furunkel bezeichnet. Sie sei gleich „breiter“ geworden und habe auch nicht so weh getan wie ein Furunkel. Ein ähnlicher kleinerer Herd entstand am rechten Arm. L. wurde an einen Facharzt überwiesen und stand fast ein Jahr lang in dessen ambulanter Behandlung, bis er sie schließlich abbrach. Es traten dann weiterhin immer neue Eiterherde an den verschiedensten Körperteilen auf. L. trat nicht mehr in ärztliche Behandlung, sondern ertrug diesen Zustand bis zum Jahr 1934. Die ganze Behandlung in der Zwischenzeit bestand in gelegentlich selbst angelegten notdürftigen Verbänden, unter denen einzelne Eiterherde, wie der Kranke bestimmt versichert, von selbst sich reinigten und mit Narben abheilten. Doch nahmen neben den stetig neu entstehenden die schon vorhandenen großen Herde solche Ausmaße an, daß L. schließlich in der Ausübung seines Berufes immer mehr gehindert war. Erst dieser Umstand führte ihn schließlich wieder einem Arzt zu, der ihn sofort der Klinik überwies.

Auf Fragen nach seinem Allgemeinbefinden gibt der Kranke an, er fühle sich, abgesehen von erträglichen Schmerzen an einigen Eiterstellen, ziemlich wohl; der Appetit sei gut, die Verdauung normal und regelmäßig, Wasserlassen unbehindert. Eine merkbare Gewichtsabnahme sei ihm nicht aufgefallen, er sei schon von jeher mager gewesen.

Alkohol- oder Nikotinabusus wird verneint, ebenso die Frage nach einer infectio sexualis. (Die anlässlich seiner Anwesenheit in der Klinik im Jahre 1925 zweimal angestellte Wassermannsche Reaktion hatte beide Male ein negatives Resultat erbracht).

Objektiver Befund vom 2. III. 1934.

170 cm großer, 63 kg schwerer Mann in mäßigem Kräfte- und Ernährungszustand. Gesichtsfarbe wettergebräunt, sichtbare Schleimhäute ausreichend durchblutet. Muskulatur mittelkräftig, Fettpolster nur gering angelegt.

Kopf: Gebiß schlecht gepflegt und erhalten, Zunge mäßig schmierig belegt. Rachen o. B. Fauliger Mundgeruch.

Hals: Schilddrüse nicht tastbar vergrößert.

Thorax: Symmetrisch, genügend gewölbt, Schlüsselbeingruben eingesunken, die Rippen treten deutlich hervor. Perkutorisch keine

deutlichen Schalldifferenzen, über allen Lungenfeldern reines Vesikuläratmen. Die unteren Lungengrenzen sind genügend verschieblich.

Röntgendurchleuchtung des Thorax: Lungenfelder einschließlich Spitzen rein, letztere hellen gut auf. Normale Hiluszeichen. Zwergfell beiderseits gut gerundet und verschieblich. Herzfigur: schmal, etwas mediangestellt, an sich nicht zu beanstanden. Gefäßband nicht verbreitert.

Herz: Herzspitzenstoß weit innerhalb der Warzenlinie, normale Dämpfungsfigur. Herztöne über allen Ostien reine, gut voneinander abgesetzt. Herzaktion gleichmäßig, regelmäßig, 76 pro Minute.

Blutdruck: 125 mm nach Riva-Rocci.


Abdomen: Fettarme, leicht eingezogene Bauchdecken, Milz und Leber sind nicht zu tasten. Soweit die Hauterscheinungen die Palpation gestatten, besteht nirgends eine abnorme Resistenz noch Druckschmerzangabe. Genitale völlig o. B.


Extremitäten: keine Umfangsdifferenzen, alle Gelenke frei beweglich.

Nervensystem: Physiologische Reflexe gleichseitig stark, keine pathologischen Reflexe. Die Sinnesorgane sind normal funktionstüchtig.

Psychisch ist der Kranke ruhig, ziemlich gleichgültig seinem Zustand gegenüber, geistig wenig beweglich. Hautbefund: Das nunmehr sechs Jahre lang durch Behandlung so gut wie nicht beeinflusste Krankheitsbild hat in dieser Zeit eine Ausdehnung erreicht, wie sie nur in wenigen Beschreibungen gleichartiger Fälle zu finden ist. Gleichzeitig ergibt die lange Dauer ungehinderten Fortschreitens des Krankheitsprozesses neben teilweise tatsächlich eingetretener Spontanheilung (!) älterer Herde eine Vielgestaltigkeit des Bildes, der gegenüber die Beschreibung fast als unzulänglich sich erweist. Die beiden beigegefügtten Abbildungen, deren eine einen Gesamteindruck des Krankheitsbildes vermittelt, während die zweite einen großen Pyodermieherd in der für den Krankheitsfall charakteristischen Form zeigt, mögen als Ergänzung ihr beigegeben werden.

Den Einzelheiten voranzustellen ist ein Hinweis auf die im Bild schon größtenteils entfernte, starke Behaarung der Brust und





Bauchgegend, die, wenn auch in geringerem Maße, auf die Extremitäten und den oberen Teil des Rückens sich weiterhin erstreckt.

Ein Gesamtüberblick über die Lokalisation der Erscheinungen läßt eine regionäre Begrenzung für die Ausdehnung des Prozesses vermissen; augenfällig ist eine dichtere Ausaat von Herden auf Brust, Bauch und den oberen Hälften der Extremitäten. Die Rückseite des Stammes weist neben zwei frischen Pyodermieherden und einigen abgeheilten Stellen im Nacken-Schulterbereich (ein großer, weit in die Tiefe reichender Absceß bildete sich hier noch im Verlauf der Behandlung) auf beiden Gefäßhälften und im Analfaltenbereich je einen großen Cutanabsceß auf. Der behaarte Kopf einschließlich Nacken-Haargrenze, die Hände und Füße erweisen sich als völlig frei von Hauterscheinungen, im Gesichtsbereich sind frische Hauteiterungen nicht vorhanden.

Die nähere Betrachtung der einzelnen Herde führt nach Anordnung und Aussehen zu etwa folgender Beschreibung:

Im Gesicht finden sich im Bereich des Bartwuchses zahlreiche kleine, strahlige, depigmentierte Narben der überstandenen Sycosis non parasitaria sowie eine breite, rötlich glänzende Narbe im linken Wangen-Unterkieferbereich, von dem angegebenen Gesichtsfurunkel herrührend.

Unterhalb des linken Schlüsselbeins liegen drei gut markstückgroße, das Hautniveau nicht überschreitende, dunkelgerötete Hautstellen, von gelblich bräunlichen Krusten teilweise überdeckt, aus deren Poren Eitertropfen unter Druck austreten. In gleicher Höhe besteht rechts ein ausgedehnter (10:6 cm) Herd von deutlich vorgewölbter, düster-bis braunrot verfärbter Haut von eigenartig schwammig-weicher Konsistenz und höckeriger bis warziger Oberflächenbeschaffenheit, unter dem eine Art schlaffer Fluktuation nachweisbar ist. Gegen den bogenförmig verlaufenden oberen Rand hin sind dicke schmutzig-bräunliche Krusten aufgelagert, unter Druck quillt aus ihnen wie aus vielen Stellen der bedeckenden Haut gelblich grüner, dünnflüssiger Eiter wie aus einem Sieb hervor. Eine am oberen Rande des Herdes liegende kleine Ulceration ist von unterminiertem, schmierig-weich überfallendem Hautrand abgegrenzt, die Sonde dringt von ihr aus in Richtung des unterminierten Herdes breit ungehindert

vor. Unterhalb der linken Brustwarze besteht ein klein handtellergroßer rundlicher Bereich bräunlich roter, vorgewölbter Haut mit ziemlich glatter Oberfläche, ohne deutlich Fluktuation, aus mäßigen Krustenauflagerungen dringt unter Druck wenig Eiter. Ein gleicher Herd liegt unterhalb des rechten Rippenbogens etwa in der Warzenlinie. Auf dem Abdomen verläuft unterhalb des Nabels quer ein 15:8 cm großer Bezirk tiefbraun pigmentierter, stark vorgewölbter Haut, die die eigenartig schwammig-poröse Konsistenz und die warzige Oberflächenbeschaffenheit noch ausgeprägter wie die oben beschriebene Stelle zeigt. Nach der rechten Seite hin nimmt sie einen mehr narbigen, derben Charakter an unter gleichzeitiger Abnahme der Pigmentation, in der linken Hälfte ist der Herd an mehreren Stellen von dicken Krustenauflagerungen bedeckt. Das siebartige Hervorquellen von Eiter tritt bei Druck verstärkt auf, selbst ein Druck auf die schon narbig umgewandelte rechte Hälfte des Herdes läßt aus der linken Eiter hervorquellen, die Sondierung bestätigt eine bis unter die schon narbig sich umwandelnde Hautdecke reichende Untermünierung, ohne daß über den ganzen Herd eine Fluktuation festzustellen wäre. Die erwähnte schwammige Hautdecke sinkt unter dem betastenden Finger schlaff ein. Die Ränder sind aufgeworfen, nach Entfernung der Hautdecke zeigen sie sich weit unterminiert; durch radikale Abkappung der durch die Eiteransammlung abgehobenen Decke wird ein verzweigtes System von Fistelgängen und Absceßhöhlen frei gelegt, in das noch zahlreiche Gänge aus dem scheinbar gesunden Gewebe bei Druck auf die Umgebung des Herdes Eiter entleeren (vgl. dazu Abbildung).

Auf dem Rücken tritt unterhalb der spina scapulae rechts ein rundlicher fünfmarkstück-großer bräunlicher Hautbezirk, leicht erhaben, mäßig überkrustet, mit geringer Eitersekretion in Erscheinung. Auf der linken Gefäßhälfte findet sich, aus einem depigmentierten, feinstrahligen Narbenherd übergehend, ein dunkel geröteter fluktuierender Krankheitsherd in Kleinhandtellergröße, von glatter Oberfläche, die an einer Stelle Krustenauflagerung zeigt. Nur aus dieser quillt unter Druck mäßig Eiter hervor, dabei äußert der Kranke an dieser Stelle erstmals stärkere Schmerzen. Solche werden dann weiter noch bei Betasten





der rechten Gefäßhälfte, wo in Nähe der Analfalte lediglich ein entzündlich geröteter, deutlich infiltrierter Hautbezirk vorhanden ist, unter dem Fluktuation nicht besteht, angegeben.

An den Extremitäten finden sich frische Herde der oben beschriebenen Art am linken Oberarm (Streck- wie Beugeseite), am linken Ober- und Unterschenkel und am rechten Oberschenkel in verschieden großer Ausdehnung, Handtellergröße nicht überschreitend.

Die Hautdecke aller dieser Eiterherde ist teilweise frei von Haaren, noch vorhandene lassen sich mit leichtem Zug ausziehen.

Neben diesen die Haut unterminierenden Eiterungen bestehen an beiden Armen einige lediglich entzündlich gerötete, etwa zehnpfennigstückgroße plaques ohne Eiteransammlung, nur leicht infiltriert. Endlich findet sich hier wie auf der Brust mehrfach stecknadelkopfgröße Eiterbläschen mit kleinem entzündlichem Hof vom Aussehen staphylogener Folliculitiden.

Zu erwähnen wären neben den bisher beschriebenen Hautveränderungen noch zahlreich vorhandene Narbenherde als Residuen abgeheilter Prozesse. Ihre Größe schwankt entsprechend den bei frischen Herden gefundenen Ausmaßen, die Form variiert weitgehend, dem Aussehen nach handelt es sich um meist in toto leicht eingesunkene, teils pigmentierte, teils depigmentierte, teils rötlich glänzende, feinstrahlig, wie ein Strickmuster aussehende Narben, deren Oberfläche mehrfach warzige bis kolbige Hautauflagerungen und Hautbrücken zeigt, deren Rand meist feingezähnt dargestellt. Einzelne große Narbenherde (so am rechten Unterarm und rechten Oberschenkel) fallen durch einen ausgesprochen lividen Farbton auf.

Die zwischen den Herden gelegene gesunde Haut ist trocken, talgarm, an den bedeckten Körperstellen pigmentarm, an den unbedeckten gleichmäßig kräftig gebräunt. Unter den Achseln besteht mäßige Schweißsekretion, Nirgends sind Comedonen oder Acnenarben zu finden.

Zur weiteren Veranschaulichung des Gesamtbildes soll der bei der erneuten Aufnahme am 11. II. 35 erhobene Befund hier gleich angefügt werden. Einzuhalten ist vorher, daß der Kranke am 8. VI. 34. aus der stationären Behandlung entlassen worden war. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Herd auf dem Abdomen völlig gereinigt, in lebhafter Granulierung noch unter

Schutzverband, gleichfalls der während der Behandlung aufgetretene Herd im Nacken-Schulterbereich. Alle übrigen Stellen waren völlig gereinigt und in narbiger Umwandlung begriffen. Zur Zeit der Wiederaufnahme, die ein halbes Jahr nach Auftreten neuer Krankheitsherde erfolgte, hatte der Prozeß, wenn auch nicht die erst geschilderte, so doch schon wieder eine erhebliche Ausdehnung erreicht. Neben dem in der rechten Oberbauchgegend schon früher vorhandenen Eiterherd, der unter narbiger Hautdecke hervor erneut aus Krustenauflagerungen vielfach Eitertröpfchen ausdrücken läßt, sind mehrere, meist kreisrunde Stellen von dem früher beschriebenen Aussehen neu entstanden. Gleichzeitig zeigt der narbig veränderte Bezirk auf der rechten Gesäßhälfte frische Krusten und Hervorquellen von Eitertröpfchen. Endlich sind, im Bereich der Krankheitsherde auf dem Abdomen gelegen, zahlreiche eitrig-folliculitiden vorhanden.

Der Allgemeinbefund hat sich dem jetzt erhobenen gegenüber in keiner Weise verändert, das bei Aufnahme 1934 63 kg betragende, bei Entlassung auf 70 kg gestiegene Körpergewicht ist in der Zwischenzeit auf 63 kg wieder abgesunken.

Der Ueberblick über den beide Male übereinstimmenden Verlauf der Krankheit und ihre Reaktion auf die therapeutischen Maßnahmen ergibt zwar in mancher Beziehung ein sich widersprechendes Bild, als Endergebnis läßt sich aber eine unbedingte Gutartigkeit des Krankheitsprozesses feststellen.

Die 1934 bestandene diffuse Ausbreitung tiefsitzender Hauteiterungen war mit rein konservativen Maßnahmen kaum zu beeinflussen. Deshalb wurde bald dazu übergegangen, durch immer erneute Freilegung der in der Tiefe der Cutis in unterminierendem Vordringen befindlichen Eiterherde und radikale, sorgfältige Entfernung der schlaffen, weit unterminierten Ränder der Ulcerationen breit zu Tage liegende glatte Wundflächen zu schaffen, die dann einer desinfizierenden und reinigenden Behandlung mit Alkoholverbänden bzw. indifferenten Salben unterzogen wurden. Die immer wieder beobachtete erneute Eitersekretion ließ sich bei Revision stets durch Auffinden neu entstandener oder neu zu Tage tretender Fistelgänge erklären und machte fortgesetzt erneute chirurgische Eingriffe notwendig. Bei dem stetigen Fortschreiten des Krankheitsprozesses wurde eine

Behandlung mit Autovaccine in üblicher Abstufung und Dosierung eingeleitet, nach deren Versagen wurden auch noch Versuche mit intravenösen Staphylo-Yatren-Injektionen sowie intramuskulären Milchinjektionen gemacht. Im späteren Verlauf der Behandlung kamen ferner energig durchgeführte Bestrahlungen mit künstlicher Höhen Sonne sowie ausgedehnte natürliche Sonnenbäder zur Anwendung.

Bezüglich des Ergebnisses der Behandlung darf — ungeachtet des Wiederaufflackerns des Prozesses — von einer günstigen Beeinflussbarkeit der Krankheit gesprochen werden. Der eingeschlagene Weg, die Erzielung glatter offener Wundflächen mit allen Mitteln anzustreben und auch kleinste Kryptenbildungen ausgiebig freizulegen, muß bei derart ausgebreiteten Formen als eine der aussichtsreichsten Maßnahmen bezeichnet werden, von der eine einigermaßen zeitlich begrenzte Besserung erwartet werden darf. Es war immer wieder die Feststellung zu machen, daß — war einmal eine absolute Beseitigung aller Eiterverhaltungen und gedeckten Eiterherde erzielt — die offenen Wundflächen eine gute Tendenz zu Granulation und narbiger Abheilung zeigten, nachdem unter Anwendung völlig indifferenter örtlicher Maßnahmen ihre Reinigung rasch eingetreten war. Inwieweit die — teils als spezifische Immunisierung, teils als unspezifische Aktivierung — durchgeführte interne Therapie den Verlauf der Heilung beeinflusst bzw. beschleunigt hat, kann angesichts der energigischen örtlichen Maßnahmen nicht mit Sicherheit beurteilt werden. Objektiv ist erwiesen, daß es trotz Einspritzungen von Autovaccine wie Staphylo-Yatren noch zur Bildung neuer unterminierender Eiterungen kam. (Noch gegen Mitte der Behandlungszeit bildete sich im Nacken-Schulterbereich ein neuer, großer Eiterherd, dessen Tendenz zu unterminierendem Ausbreiten mehrfaches Eingreifen erforderlich machte). Ein günstiger Einfluß auf den Krankheitsprozeß durch diese Therapie kann also jedenfalls nur in beschränktem Maße angenommen werden.

Die ausgedehnten Bestrahlungen mit künstlicher Höhen Sonne und auch natürlicher Sonne in Form von über Stunden ausgedehnten Sonnenbädern ließen eine Beschleunigung des Heilverlaufes nicht verkennen. Die Haut reagierte mit einer kräftigen gleichmäßigen Pigmentanhäufung, die offenen Wundflächen zeig-

ten erhöhte Tendenz zur Reinigung und Granulation, selbst die Revision noch vereiterter Stellen ließ den Eindruck entstehen, als vollzöge sich das unterminierende Vordringen der Eiterung weniger hemmungslos als zuvor. Die kräftige, durch derartige Bestrahlungen erzielbare Hauthyperämie, in ihrem Gefolge die Steigerung des Hautstoffwechsels, läßt die Vermutung zu, daß dadurch die in ihrer biologischen Wertigkeit gebesserte Haut die Fähigkeit einer gesteigerten Abwehrkraft gegenüber dem Einwirken der Noxe erfahren könnte. Im Verlauf der 1935 erfolgten Behandlung wurde die Behandlung lediglich in Form der beschriebenen energischen örtlichen Maßnahmen durchgeführt. Der Heilverlauf war gleich günstig wie im Vorjahr, die Absicht einer diesmal über die Heilung hinaus durchzuführenden Kontrolle wurde durch Weigerung der Krankenkasse, die Kosten noch weiter zu übernehmen, zunichte gemacht, sodaß der Kranke, wohl frei von Eiterherden, aber mit noch in Abheilung befindlichen Wundflächen entlassen werden mußte.

Das Allgemeinbefinden erwies sich — wenn überhaupt — lediglich durch zeitweise von Seiten einiger tiefer Abszeftherde ausgelöste Schmerzen als in geringem Maße beeinträchtigt; sonst wurden subjektive Klagen nie vorgebracht. Objektiv bestand gute Eßlust (Gewichtszunahme von 7 kg), der Verdauungstractus arbeitete störungslos, die Miktion war unbehindert. Die Temperatur stieg, abgesehen von mäßiger Reaktion auf einige Milchinjektionen, nie über 37,30, rectal gemessen, an. In dem fortlaufend kontrollierten Urin waren weder mit chemischen noch mit mikroskopischen Methoden jemals pathologische Bestandteile nachzuweisen.

Das morphologische Blutbild zeigte einen der Norm entsprechenden Befund, die zahlenmäßige Auswertung ergab innerhalb physiologischer Grenzen liegende Werte.

Von einer histo-pathologischen Untersuchung mußte leider Abstand genommen werden. Maßgebend hierfür war die Erwägung, daß der Kranke bei der Vornahme von Probeexcisionen, die hier weit in die Tiefe bis fast ins Unterhautgewebe hinein zur Ueberblickung des Gesamtbildes erforderlich gewesen wären, durch Eröffnung tiefer gelegener Blutbahnen in dem bakterienverseuchten Gewebe der Gefahr einer weitergreifenden





Infektion hätte ausgesetzt werden können. Die oberflächlichen Abtragungen mit Schaffung glatter Wundflächen können hinsichtlich des Gefahrmomentes mit der Vornahme einer tiefen Keilexcision nicht verglichen werden und rechtfertigen sich im übrigen durch das Vorliegen absoluter Notwendigkeit. Der Ausfall eines wertvollen Faktors für die Beurteilung und Deutung des Krankheitsbildes wird hierbei voll anerkannt. Der differentialdiagnostische Zweck einer Probeexcision scheint aus verschiedenen Erwägungen heraus in unserem Falle nicht die bedeutungsvolle Rolle zu spielen wie in, wenn auch gleichartigen, so doch in dieser Hinsicht fraglicheren Fällen.

Die bakteriologischen Untersuchungen des Eiters aus großen, offenen Abscessherden führten im Ausstrich zum Nachweis einer Mischflora von Staphylococcen und Streptococcen. Auf flüssigen Nährböden wurden Kulturen von hämolyzierenden Staphylococcen und Streptococcen gezüchtet, während feste Nährböden steril blieben. Aus dem geschlossenen Eiterbläschen einer Folliculitis entnommener Eiter ergab in mehrmaliger Untersuchung Reinkulturen von *Staphylococcus aureus pyogenes hämolyticus*. Im Blut waren Coccen nicht nachweisbar.

Die mehrfach angestellte Tuberculin-Cutan-Reaktion nach Pirquet verlief negativ.

Die Wassermannsche Reaktion fiel insgesamt viermal negativ aus, das Gleiche war bei den Ergänzungsreaktionen nach Meinicke und Sachs-Georgi der Fall.

Zum Nachweis von Hefepilzen angelegte Kulturen gingen nicht an.

In Nativ-Präparaten konnten niemals Pilzfäden gefunden werden.

Fall II: Bauer T., 71 Jahre alt.

Aus der Familienanamnese ist zu entnehmen, daß der Vater mit 77 Jahren an Schlaganfall, die Mutter mit 75 Jahren an Wassersucht gestorben ist. Von 6 Geschwistern leben 3, sind gesund, 3 sind im Säuglingsalter gestorben (?). Die Ehefrau, 59 Jahre alt, ist gesund. Von 8 Kindern leben 5 gesund, 3 sind im Säuglingsalter gestorben (?).

Von dem Kranken ist zu erfahren, daß er früher nie ernst-

lich erkrankt war. 1928 fiel ihm beim Holzfällen ein Baum auf die Kreuzgegend. Wegen ärztlich festgestellter Hüftnervenquetschung bezog er einige Jahre lang eine Zusatzrente. 1929 erlitt er eine Schnittverletzung der linken Hand (Mittelfinger).

Die Vorgeschichte der jetzigen Erkrankung führt der Kranke auf den August 1934 zurück. Er stieß sich damals bei der landwirtschaftlichen Arbeit an einer Holzkante und zog sich eine leicht blutende Schürfverletzung unterhalb des Grundgelenkes des rechten Mittelfingers auf dem Handrücken zu. Er beachtete dies nicht, stieß sich einige Tage später an der gleichen Stelle nochmals, was wiederum lediglich eine erneute leichte Aufschürfung zur Folge hatte. Auch jetzt schenkte er der Verletzung noch keine Beachtung und arbeitete — ohne Schutzverband — wie zuvor weiter. Die Wunde heilte nicht ab, vergrößerte sich stetig und bedeckte sich mit eiterigen Krusten. Sie war markstückgroß, als er sich in Behandlung eines Baders begab, der mit Höllensteinäzungen und Jodpinselungen während eines dreiviertel Jahres den Prozeß nicht zum Stillstand bringen konnte. Bis April 1935 war der Herd gut fünfmarkstückgroß geworden, der umgebende Handrücken stark gerötet und geschwollen, die Finger 2-4 waren durch gleichartige starke Schwellung fast unbeweglich geworden. Jetzt suchte der Kranke einen Arzt auf. Unter konservativer, später operativer Behandlung (Abtragung mit Diathermieschlinge) nahm der Herd dennoch an Ausdehnung zu und griff unterminierend auf die Grundphalangen der vier Finger über, die infolge zunehmender Schwellung völlig unbeweglich wurden. Auch der Handrücken schwoll zusehends weiter an. die Eitersekretion war nur gering, die Schmerzen in Ruhestellung mäßig. Der Kranke wird schließlich von der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft zur Behandlung in die Klinik eingewiesen.

Er äußert außer Feststellung der Unbrauchbarkeit seiner rechten Hand keine wesentlichen Klagen. Appetit und Schlaf sind gut, der Verdauungsapparat arbeitet störungslos, die Miktion ist ungehindert. Fragen nach Alkohol — oder Nikotinabusus werden verneint, ebenso die nach einer früheren Infectio sexualis. — Von Beruf ist der Kranke Bauer, der während seines ganzen Lebens seinen Hof bewirtschaftet hat.

Objektiver Befund: 71 jähriger Mann in verhältnismäßig genügendem Ernährungs- und Kräftezustand, 1,68 m groß, 68,9 kg schwer.

Gesichtsfarbe wetterfrisch, kleiderfreie Teile der Haut wettergebräunt, Degeneratio cutis rhomboidalis nuchae. Sichtbare Schleimhäute gut durchblutet. Rachenring leicht gerötet, Tonsillen hypertrophisch, frei von Belägen; Gebiß sehr schadhaft.

Lungen: Keine Schall differenzen, Grenzen normal stehend, genügend verschieblich. Atemgeräusch rein vesikulär.

Herz: Normale Dämpfungsfigur. Töne rein, Aktion gleichmäßig, regelmäßig, 84 pro Minute. Blutdruck 140 mm nach Riva Rocci.

Abdomen: Weich. Leber überragt den Rippenbogen um zwei Quersfinger, ist weich, gering druckempfindlich. Milz nicht tastbar. Keine abnorme Resistenz, kein sonstiger Druckschmerz.

Extremitäten: Ausschließlich des Sonderbefundes ohne Besonderheiten.

Nervensystem: Reflexe normal auslösbar, keine pathologischen Reflexe.

Sonderbefund: Die krankhaften Hautveränderungen beginnen etwa zwei Quersfinger distal des rechten Handgelenkes und bedecken den Handrücken in ganzer Breite. Die Finger 2 — 4 sind in ihren Grundphalangen mitergriffen. Ausgesprochen ist eine hochgradige Schwellung der ganzen vorderen Hand sowie der sämtlichen Finger bis in die Endphalangen. Der ganze Bereich ist dunkel gerötet, unter Betaftung prall-ödematös, unter der Hautoberfläche sind mehrfach knotige Infiltrate zu fühlen, teilweise auch gelblich durch die Haut schimmernd sichtbar. Die an Arm- und hinterer Handrückenregion kräftige Behaarung fehlt im Bereich des Krankheitsherd des bis auf einzelne im Zentrum frischer, eitriger Folliculitiden stehende Haare. Auf den Grundphalangen des 2. bis 4. Fingers sitzt je ein den Finger zur Hälfte umgreifendes, von wallartigem, unterminiertem Rand begrenztes Geschwür mit schmierig eitrig belegtem Grund. Ein weiterer Eiterherd liegt unterhalb des Grundgelenkes des zweiten Fingers, radialwärts von wallartigem, bogenförmigem Rand abgegrenzt. Als Folge der schon mehrfach durchgeführten Gewebsabtragungen ist es zu unregelmäßiger höckeriger Narbenbildung und

eigenartig warziger Granulierung gekommen. Stellenweise ist die angeschwollene Region stark druckschmerzhaft. Die Finger sind lediglich in den Endgelenken gering beweglich, stehen in steifer Spreizstellung.

Mit Zurückgehen der Schwellung im Verlauf der Behandlung tritt die höckerig-warzige Oberflächenbeschaffenheit immer deutlicher hervor. Der Grund der Geschwüre zeigt nach Reinigung eine grob wuchernde Granulation, die unterminiert überhängenden Ränder wuchern lappig. Auf dem Handrücken läßt sich immer wieder eine breiig-talgige Schicht leicht mit der Pinzette entfernen. Dabei treten auf stärkeren Druck dicke, gelbliche Breipfröpfe an verschiedenen Stellen aus, nach deren Entfernung ein bis stecknadelkopfgroßer, in die Tiefe sich verengender Krater freigelegt wird, aus dessen Tiefe weitere wurstförmige Breimassen ausgepreßt werden können. Es handelt sich hier wohl um unförmig erweiterte Follicelmündungen. Nach Abtragung der wallartigen Ränder mit der Diathermieschlinge scheint schon nach wenigen Tagen eine erneute Vegetation in den geschaffenen Wundflächen einzusetzen.

Bei Abschluß der Beobachtung hat sich auf der Ulnarseite des Handrückens in dem schon narbig umgewandelten Bereich eine neue Hautleiste über das Hautniveau gehoben, unter der hervor geringe eitrige Sekretion unter Druck erfolgt, während aus den übrigen Herden lediglich die erwähnten talgartigen Breipfröpfe unter Druck auszupressen sind. Eitrige Erscheinungen bestehen hier oberflächlich in Form einiger Folliculitiden, aus der Tiefe treten vereinzelt noch unter Druck kleine Mengen reinen Eiters aus Follikelmündungen.

Von durchgeführten Untersuchungen zeigte die des Harnes nie Anwesenheit von Eiweiß oder Zucker, Urobilinogen war zeitweise in Spuren vorhanden, das Sediment enthielt keine pathologischen Bestandteile.

Blutbild: Hämoglobin 86%. — Erythrocyten: 4 600 000. — Leucocyten: 6 400.

Differenzierung: Segmentkernige Z. 64, Stabkernige Z. 6, Lymphocyten 21, Monocyten 6, Eosinophile Z. 1. — Rotes Blutbild ohne Besonderheiten.

Histologische Untersuchungen an abgetragenen Gewebsteilen

der wallartigen Geschwürsränder erbrachten den nachfolgenden Befund des pathologischen Instituts der Universität Erlangen:

Starke Epithelwucherung, wobei die Plattenepithelien hochdifferenziert sind, keine Kernpolymorphien zeigen und auch keine Mitosen enthalten. Anhaltspunkte für etwas Malignes fehlen demnach. — In den im Schnitt getroffenen Cutisanteilen starkes entzündliches Infiltrat, das sich vorwiegend aus Lymphocyten und Plasmazellen aufbaut und nur wenige Leucocyten enthält. Das Ganze ist wohl aufzufassen als atypische Epithelwucherung auf Grund einer vorhandenen starken Entzündung.

Das untersuchte Gewebstück stammt vom Geschwürsrand, es ist also noch normales Plattenepithel der Haut vorhanden, darunter ebenfalls Infiltrate und Hornmassen.

An der Oberfläche des Geschwüres ebenfalls Hornmassen, untermischt mit eiweißreicher Flüssigkeit.

Diagnose: Starke chronische Entzündung der Haut mit atypischer Epithelwucherung.

Der Ausstrich von Eiter aus offenen Herden zeigt massenhafte Mischflora verschiedener Coccenarten neben Zelldetritus und amorpher Hornsubstanz. Auch in den eigenartigen Breipfröpfen fanden sich mäßig Coccenarten, nur einzelne zerfallene Leucocyten und eine homogene Masse von Hornsubstanz und Talg. Kulturell konnten aus geschlossenen Eiterhöhlen Reinulturen von Staphylococcen mehrfach gewonnen werden.

Die Cutanimpfung nach Pirquet verlief reaktionslos.

Die Komplementbindungsreaktionen nach Wassermann, Meinicke und Kahn fielen negativ aus.

In Nativ-Präparaten konnten Pilze nie nachgewiesen werden.

Die differentialdiagnostischen Erwägungen haben eine ganze Reihe anders gearteter Hauterkrankungen zunächst zu berücksichtigen.

Gegen die Möglichkeit tuberculöser Genese spricht in erster Linie in beiden Fällen der gutartige Verlauf wie die prompte Reaktion auf eine völlig unspezifische Therapie. Das im Fall I beobachtete verhältnismäßig rasche Wiederaufflammen des Prozesses steht dem nicht entgegen. Anhaltspunkte für einen tuberculösen Infect im Gesamtorganismus konnten auch röntgenologisch nicht gefunden werden. Wäre selbst in ihrem Vorhandensein

der Beweis tuberculöser Genese nicht absolut sicher gegeben, so schließt ihr Fehlen diese Frage umsomehr aus. Der mehrfach negative Ausfall der Cutanreaktion nach Pirquet darf in gleichem Sinne angeführt werden. Die Annahme einer Hauttuberculose kann angesichts dieser Gründe trotz Fehlens eines histologischen Befundes abgelehnt werden.

Neben der Tuberculose muß im Fall II an einen malignen Prozeß gedacht werden. Soweit hier nicht die mit indifferenten Maßnahmen bis jetzt erzielte Besserung gegen ein Carcinom spricht, genügt für diesen Gegenbeweis das Resultat der histologischen Untersuchung.

Die in beiden Fällen, besonders im erst beschriebenen, in Betracht kommende Möglichkeit einer luetischen Grundlage wird durch den mehrfach negativen Verlauf der Wassermannschen Reaktion und deren Ergänzungsreaktionen wie außerdem durch den Erfolg der unspezifischen Therapie ausgeschlossen. Von dem in mehreren Fällen mit einer Verschlechterung des Zustandes einhergegangenen Versuch einer Jodkalibehandlung wurde Abstand genommen.

Die Hefepilzerkrankung der Haut stößt an sich auf diagnostische Schwierigkeiten angesichts des Vorkommens von Hefen auf der gesunden Haut. Sie entfällt angesichts eines völlig negativen Kulturnachweises umso sicherer. Eine Sporotrichose konnte bei dem stets negativen Ergebnis mehrfacher mikroskopischer Untersuchungen nicht angenommen werden.

Bromoderma und Jododerma tuberosum schließen sich durch Fehlen anamnestischer Hinweise allein schon aus: die Jodtherapie im Fall II kam ja erst im Verlauf der Krankheit zur Anwendung.

Gegen eine Actionomycose spricht im wesentlichen wieder der gutartige Verlauf der Erkrankung.

Die heute allgemein geforderten differentialdiagnostischen Erwägungen sind damit erschöpft.

Die Diagnose *Pyodermia chronica papillaris et exulcerans* muß ihre Begründung zunächst in dem negativen Ergebnis der differentialdiagnostischen Erwägungen finden. Soweit die durchgeführten Untersuchungen dabei als nicht vollgültig erscheinen, gibt in beiden Fällen der objektive Erfolg einer unspezifischen Therapie den Ausschlag. Hauterscheinungen von derartiger Aus-

dehnung wie Chronizität des Verlaufes sind im Falle spezifischer Ursache durch indifferente Therapie sicherlich nicht zu beeinflussen.

Für die Diagnose spricht weiterhin der zwar nur eingeschränkt verwertbare Nachweis von Pyococcen. Die Einschränkung seiner Bedeutung darf nicht außer Acht gelassen werden, solange die Frage nach dem Wesen der hier sichtbaren Coccenwirkung noch der Klärung hart.

Endlich bleibt für die Wertung der Diagnose der Vergleich mit im Schrifttum vorliegenden Fällen. Dabei kann festgestellt werden, daß die im Fall I geschilderte Ausaat der Herde über fast den ganzen Körper verhältnismäßig selten sich beschrieben findet. In dieser Hinsicht kommen Kumers Fall XI und der Einzelfall von Tschernoguboff unserem erst beschriebenen Krankheitsbild am nächsten. Auf die erwähnten acneconglobata-ähnlichen Fälle H. Hoffmanns soll angesichts des Fehlens mikroskopischer Einzelheiten bei unserem Fall I auch in einem Vergleich des klinischen Bildes nicht näher eingegangen werden, wenn auch im Vorhergegangenen ihre Einreihung in die Gruppe der chronischen Pyodermien in Frage gezogen worden war. Die Einzelherde in unserem Falle I weisen dagegen alle Merkmale der eingangs zusammenfassend beschriebenen *Pyodermia chronica papillaris et exulcerans* auf. Im Schrifttum wiedergegebene Abbildungen frischer, krustig überdeckter Ulcerationen wie wärzighöckeriger Narbenflächen usw. ermöglichen einen Vergleich aller Formen und Stadien unseres Falles mit denen des Schrifttum. Die beiden beigelegten Abbildungen mögen diesen Vergleich auch in umgekehrter Richtung dienen.

Unser Fall II kennzeichnet die bevorzugte Lokalisation der *Pyodermia chronica papillaris et exulcerans* und findet sich demzufolge in ähnlicher Form häufiger veröffentlicht. Von Kumers 12 Fällen sind fünf auf einen oder beide Handrücken beschränkt. Große äußerliche Ähnlichkeit zeigt Fall III von Zurhelle und Klein (siehe auch Abbildungen). Das Werk Arzt's und Zielers (Die Haut- und Geschlechtskrankheiten) bringt im Rahmen einer Abhandlung über *Pyodermia chronica papillaris et exulcerans* von Mucha die Abbildung eines derartigen Herdes auf dem Handrücken als charakteristisches Bild dieser Hautaffektion. Sie fordert zu einen Vergleich mit dem beigegebenen Bild un-

feres Falles II heraus, das übrigens in der Reihe der im Schrifttum vorhandenen hervorgehoben zu werden verdient.

Die Sicherung der Diagnose ist durch diese vergleichende Betrachtung im Anschluß an die vorher angeführten Gründe soweit ermöglicht, als die Unklarheit über einige Fragen dies heute gestattet.

Der Versuch einer Erklärung des mit entzündlichreaktiver Epithelwucherung einhergehenden chronischen Fortschreitens des Krankheitsprozesses, wie es im gefärbten Schnittpräparat uns vor Augen tritt, hat den Erreger ebenso wie das Hautterrain zu berücksichtigen. Tschernoguboff nimmt eine bisher nicht beobachtete Fähigkeit des Pyococcon, den Reiz zur Bildung unspezifischen Granulationsgewebes abzugeben, neben einer herabgesetzten biologischen Wertigkeit der Haut an. Der letztere Hinweis hat schon vor ihm wie besonders in der Folge im Schrifttum Beachtung gefunden. So ist auch in der Einleitung schon hervorgehoben, daß ein durchschnittlich mäßiger Ernährungszustand der Kranken ebenso wie die Hauthygiene nachteilig beeinflussende Berufsarten die Krankheit begünstigende Faktoren darstellen. Unser Fall I kann als Beweis dafür ebenfalls herangezogen werden; ein Mangel an Reinlichkeitsgefühl ergibt sich aus der Tatsache, daß der Kranke sieben Jahre lang mit einer zunehmenden Anzahl von stark sezernierenden, schließlich übelriechenden Eiterherden sich keiner sachgemäßen Behandlung unterzog. Die ungewöhnlich große Zahl von Krankheitsherden findet darin zum Teil ihre Erklärung. Im Falle II war der beteiligte Handrücken ein ganzes Leben lang zahlreichen Schädigungen, wie sie der landwirtschaftliche Beruf mit sich bringt, ausgesetzt. Es ist kennzeichnend für die Bedeutung der Hautbeschaffenheit, wenn es im Anschluß an eine Verletzung im Bereich der geschädigten Hautregion nicht zur acut verlaufenden Reaktion etwa in Form einer Phlegmone oder eines Panaritiums usw., sondern zum Bilde der Pyodermia chronica papillaris et exulcerans kam. Der, wie auch in unserem Falle, mehrfach als Ausgangspunkt der Erkrankung erwähnten Verletzung meist geringfügiger Art kommt demnach keine übermäßige Bedeutung für das Zustandekommen der Affektion zu, da auch die überwiegende Mehrzahl der beschriebenen Krankheitsfälle ohne erkenn-

bare Verletzung der Hautdecke entstanden ist. Auch die Follikel dürfen, — obwohl häufig als der primäre Entzündungsherd nachgewiesen —, damit wohl nicht für den ganzen weiteren Verlauf der Erkrankung verantwortlich gemacht werden.

Cueni sucht an Hand von histologischen Serienuntersuchungen der Folliculitis et Perifolliculitis capitis suffodiens et abscedens nachzuweisen, daß die eigenartige entzündlich-reaktive Epithelwucherung ausschließlich auf Grund eines Entzündungsreizes zustande kommt, der von Zerfallprodukten der im Follikel gestauten Hornmassen ausgelöst wird. Innerhalb der von Follikel aus in die Tiefe gesproßten Epithelschläuche und derart gebildeten Hohlräume kommt es nach seiner Annahme erst sekundär zur Eiterbildung durch auf dem vorgebahnten Wege eingewanderte Pyococcen.

Hauck glaubt demgegenüber eine den Krankheitsprozeß vorbereitende Hautschädigung, die er bei fünf beobachteten Fällen in der Einwirkung von Kampfgasen des Weltkrieges erblickt, annehmen zu dürfen.

Die Erklärung von Cueni bedarf wohl weiterer Bestätigungen schon für die Folliculitis et Perifolliculitis capitis suffodiens et abscedens, für die Pyodermia chronica papillaris et exulcerans mit ihren teilweise nichtfolliculären Formen kann sie sicherlich nicht übernommen werden. Die Annahme einer herabgesetzten biologischen Wertigkeit der Haut bildet angesichts der fast übereinstimmend dahinweisenden Beobachtungen einen Faktor zur Erklärung des Wesens der chronischen Pyodermien, der heute unbeschadet weiterer Forschungsergebnisse ziemlich feststeht.

Wird auch das hemmungslose Fortschreiten des Prozesses wie das in verschiedenen Fällen beschriebene disseminierte Auftreten dadurch verständlich, so bleibt doch die Frage noch offen, warum es bei diesen hartnäckigen und chronischen Eiterungsprozessen nicht zu einer schweren Allgemeinreaktion kommt. Zu ihrer Beantwortung soll zuerst eine herabgesetzte Virulenz der Erreger in Betracht gezogen werden. Diesbezügliche Versuche mit Eiter- oder Gewebstückchen aus Pyodermieherden führten bei Kaninchen zu subcutan sich entwickelnden, eitrig infiltrierenden Knoten (Zurhelle und Klein) und bei einem Menschen zu einer Impetigopustel (Kumer). Ruiter erzielte beim Kaninchen durch

Eiterüberimpfung eine chronische Pyodermie, Mrongovius sah bei intraperitonealer Überimpfung keinerlei Reaktion. Andererseits konnte Ruiter einmal eine acute streptogene Sepsis beim Kaninchen beobachten, die jedoch vielleicht in einer ungewollten Eröffnung der Blutbahn bei der Injektion ihren Grund haben könnte. Zurhelle und Klein berichten bei Versuchen intracutaner Überimpfung mit Eiter von ihrem Fall III von Auftreten einer acuten Gewebsentzündung mit ödematöser Schwellung und Abscedierung. Diese zum Teil sich widersprechenden Resultate können, zumal bei der Unsicherheit aller Virulensbestimmungen, kaum als beweiskräftig erachtet werden.

Die Vermutung aktiver Immunisierungsvorgänge taucht bei Tschernoguboff erstmals auf und wird im späteren Schrifttum mehrfach aufgegriffen. So suchten Zurhelle und Klein diese Frage im Tierversuch zu klären und berichten über gelungene aktive Immunisierung lange Zeit vorbehandelter Kaninchen selbst gegen intravenös gegebene Aufschwemmungen frischer *Pyococcenkulturen*. Ist damit diese Frage auch noch nicht endgültig entschieden, so sprechen doch die vielen Fälle jahrelangen Bestehens von Eiterherden für die Annahme einer solchen Immunisierung.

Unser Fall I zeigt anamnestisch eine 18 Jahre zurückliegende Furunculose, in deren 10jährigem Verlauf weiterhin eine staphylogene Sycosis und daran anschließend endlich das acht Jahre zurückliegende Erstauftreten typischer Herde der *Pyodermia chronica papillaris et exulcerans*. Der trotz ausgebreiteter schwerer Hauteiterungen günstige Verlauf ohne Anzeichen einer Beteiligung des Gesamtorganismus würde geradezu unwahrscheinlich, wollte man die Vermutung, daß es in dem langen Zeitraum zu ausreichender Antikörperbildung gekommen ist, ohne weiteres ablehnen.

Es scheint letzten Endes ein Zusammenwirken verschiedener der angeführten Faktoren Ausbruch und Verlauf der Affektion zu bestimmen, indem auf einem funktionell unterwertigen Hautterrain, hervorgerufen durch in ihrer Vollwirksamkeit durch immunisatorische Vorgänge relativ gehemmte Eitercoccen, eine etwa im Sinne einer allergischen Reaktion zu denkende chronische Entzündung in atypischer Form abläuft.

Ein vergleichender Ueberblick über die Behandlung zeigt

eine Fülle von Maßnahmen. Neben einfacher reinigender und desinfizierender Feuchtbehandlung werden Salben von durchaus indifferenten bis zu ätzender Zusammensetzung empfohlen. Bestrahlungen mit Quarzlicht wurden mehrfach erwähnt, die Resultate lauten wenig ermutigend. Ueber künstliche oder natürliche Sonnenbäder — wie bei unserem Fall I beschrieben — finden sich keine Angaben. Operative Maßnahmen, — in Form von gründlicher Abtragung der unterminierten Hautdecken und -ränder vielfach durchgeführt — werden darüber hinaus sehr eingeschränkt. Die Fälle von Dammann, Carol, Zurhelle und Ruiter, in denen eingreifende operative Maßnahmen zur Anwendung kamen (aus jeweils gegebenen besonderen Indikationen heraus), zeigen ein verstärktes Recidivieren im Wundbereich; zu welcher Ausdehnung der Krankheitsherde es dabei kommen kann, wird aus einer von Zurhelle und Ruiter beigegebenen Abbildung in erschreckender Weise ersichtlich.

Die parenteral zur Anwendung gelangende Therapie beschränkt sich auf die Durchführung einer unspezifischen oder auch spezifischen Aktivierung. Erstere, seltener erwähnt, ließ keine nachweisbaren Erfolge feststellen, solche der letzteren sind sehr umstritten. Man findet Angaben über frappante Wirkung von Autovaccinen, Staphylo- bzw. Strepto-Yatren oder Toxinaufschwemmungen von Pyococcen neben solchen über völliges Versagen dieser Therapie. Ein Punkt ist jedenfalls bei der Bewertung der therapeutischen Resultate zu berücksichtigen: Diese Maßnahmen summieren sich hier fast immer mit den örtlichen. Es wird in den meisten Fällen schwer sein, die Wirkung des Einzelfaktors genau zu beurteilen. Im übrigen spielen individuelle Eigenarten der Reaktionsfähigkeit eine nicht zu unterschätzende Rolle.

Im Allgemeinen ist festzustellen, daß die Behandlung mit unspezifischen, meist ziemlich indifferenten örtlichen Maßnahmen verschiedenster Art wenn nicht Heilung, so doch meist eine günstige Beeinflussung der Affektion erzielen ließ.

Die Prognose kann allgemein quoad vitam als durchaus gut betrachtet werden, quoad sanationem ist diese Bewertung unbedingt einzuschränken. Neben Fällen, die unter einfachsten Reinigungsmaßnahmen prompt abheilten, wird über solche berichtet,

die sich einer kombinierten konservativen, internen (spezifischen bzw. unspezifischen) und chirurgischen Therapie gegenüber als ziemlich hartnäckig erwiesen. Die Langwierigkeit des Heilverlaufes führt in vielen Fällen zum Abbruch der Behandlung durch den Kranken oder auch durch die Krankenkasse bzw. andere Versicherungsträger.

Weiterhin begünstigt eine gegen die Bakterienwirkung nicht voll widerstandsfähige Haut natürlich Recidive. Bei unserem Fall I, der infolge seiner Ausbreitung eine lange Behandlung erforderlich machte, wurde eine völlige Ausheilung zweimal durch frühzeitige Unterbrechung der Therapie infolge finanzieller Schwierigkeiten verhindert. Das erstmals dann schon nach drei-viertel Jahren aufgetretene ausgedehnte Recidiv läßt die Prognose hinsichtlich einer vollständigen Ausheilung auch nach der zweiten Behandlung noch sehr fraglich stellen, zumal der Kranke nach seiner Entlassung aus der Klinik sofort wieder seine frühere Arbeit mit den für seine Haut anscheinend ungünstigen Umwelt-Einflüssen aufnehmen mußte. Eine Prognose bei unserem Fall II kann heute während der Behandlung noch nicht gestellt werden. Nach dem bisherigen Verlauf muß sie trotz guter Beeinflussung des Krankheitsprozesses als fraglich bezeichnet werden. In Widerspruch zu der allgemein geltenden Ansicht, daß Bewegungseinschränkungen durch Narbenbildung bei chronischen Pyodermien nicht vorkommen, kann mit Sicherheit behauptet werden, daß die Einschränkung der Fingerbewegung (des Faustschlusses) hier nicht mehr völlig sich ausgleichen wird.

Zusammenfassung.

Es werden zwei Fälle von chronischen, flächenhafter unterminierend fortschreitender Hauteiterung mit Übergang in wuchernde Narbenbildung beschrieben.

Die Diagnose *Pyodermia chronica papillaris et exulcerans* wird an Hand des einschlägigen Schrifttums mit den heute zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Untersuchung gesichert.

(Einleitend wird das vorhandene Schrifttum einer kurzen zusammenfassenden Betrachtung unterzogen).

Für gütige Ueberlassung der Arbeit und zu deren Durchführung gegebene Anregungen bin ich Herrn Universitätsprofessor Dr. med. Hauck zu ergebenem Dank verpflichtet.

Literaturverzeichnis.

1. *Biberstein*, Handbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten. Bd. IX/II: Bakteriologische Einleitung zu den Pyodermien.
2. *Bizzozzero*, (Archiv für Dermatologie und Sy. Bd. 114/S. 111: Folliculitis et Perifolliculitis ulcerans serpiginosa.
3. *Bosselini*, Dermatologische Zeitschrift Bd. 96/S. 229: Über eine chronische verrucoide Dermatitis der unbedeckten Körperteile.
4. *Cueni*, Dermatologische Zeitschrift Bd. 51/II/S. 97: Zur Kenntnis der Pathogenese der Perifolliculitis capitis suffodiens et abscedens E. Hoffmann.
5. *Dammann*, Archiv für Dermatologie und Sy. Bd. 153/S. 278: Pyoderma chronica serpiginosa superficialis ulcerativa.
6. *Dittrich*, Dermatologische Zeitschrift Bd. 62/S. 252: Lupus vulgaris serpiginosus unter dem Bilde einer chronischen Pyodermie.
7. *Fischel*, Archiv für Dermatologie und Sy. Bd. 139/S. 154: Über eine kleinpustulös wuchernde Dermatose.
8. *Galewski*, Handbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten Bd. XIII/I: Erkrankungen der Haare und des Haarbodens.
9. *Hauck*, Dermatologische Zeitschrift Bd. 53: Beitrag zur Aetiologie der Folliculitis et Perifolliculitis capitis suffodiens et abscedens E. Hoffmann.
10. *Hilgers*, Handbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten Bd. II: Saprophytäre und pathogene Bakterien der Haut.
11. *Huber*, Archiv für Dermatologie und Sy. Bd. 49/S. 57: Perifolliculitis suppurativa und frambösiiforme Vegetationen im Anschluß an Ekzem.
12. *Hoffmann Erich*, Dermatologische Zeitschrift Bd. 15/S. 22: Perifolliculitis capitis suffodiens et abscedens.
13. *Hoffmann Heinrich*, Archiv für Dermatologie und Sy. Bd. 151/I/S. 154: Über einige acne-conglobata-ähnliche Fälle.
14. *Jestonek*, Biologie der Haut: Staphylococcenwirkung.
15. *Jadassohn und Jessner*, Handbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten Bd. IX/II: Definition und Einteilung zu den Pyodermien.
16. *Köhler*, Dermatologische Wochenchrift Bd. 80: Mitteilung eines eigenartigen Falles von unterminierender Narbenbildung nach chronischer Eiterung am behaarten Kopf.
17. *Kogoj*, Archiv für Dermatologie und Sy. Bd. 19/S. 859: Beiträge zur Frage der chronischen Pyodermien.
18. *Kumer*, Dermatologische Zeitschrift Bd. 48/S. 1: Über Pyoderma chronica papillaris et exulcerans.

19. *Lucasiewicz*, Archiv für Dermatologie von 1891: Folliculitis exulcerans.
 20. *Mucha*, Arzt und Zieler: Die Haut- und Geschlechtskrankheiten Bd. III: Pyodermia chronica papillaris et exulcerans.
 21. *Ruiter*, Archiv für Dermatologie Bd. 149/S. 76: Zum Bilde der Pyodermia chronica papillaris et exulcerans.
 22. *Tachau*, Handbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten Bd. IX/S. 2: Acne-conglobata-ähnliche Dermatoſen-Pyodermia chronica papillaris et exulcerans.
 23. *Iſchernoguboff*, Archiv für Dermatologie Bd. 149/S. 76: Zur Frage der chroniſchen Pyodermien. (Ein Fall von chroniſch vegetierender Pyodermie).
 24. *Iſſchenko u. Kroicik*, Dermatologiſche Zeiſchrift Bd. 53/S. 11: Zur Frage der Pyodermia chronica ſerpiginosa.
 25. *Žurhelle und Klein*, Dermatologiſche Zeiſchrift Bd. 46/S. 63: Chroniſch vegetierende und ulcerierende Pyodermien mit ſerpiginöſem Fortſchreiten und flächenhafter Narbenbildung. (Pyodermia chronica papillaris et exulcerans).
 26. *Žurhelle und Ruiter*, Archiv für Dermatologie Bd. 151/S. 387: Kliniſcher und experimenteller Beitrag zur Pyodermia chronica.
-

Lebenslauf.

Ich, Friedrich Otto Scheider, wurde geboren am 8. IX. 1909 zu Ansbach als Sohn des damaligen Rechnungskommissärs Friedrich Scheider und seiner Ehefrau Emma, geborene Rueff.

Von 1915 bis 1919 besuchte ich die Volkshauptschule Schwabach und trat dann in die humanistische Abteilung des Progymnasiums mit Realschule Schwabach über. Von hier erfolgte 1925 mein Übertritt an das Neue Gymnasium Nürnberg, an dem ich 1928 die Reifeprüfung ablegte. An der Universität Erlangen widmete ich mich dem Studium der Medizin und legte dortselbst 1931/32 die medizinische Vorprüfung und im Herbst 1933 das medizinische Staatsexamen ab. Seither arbeitete ich an der Universitätsklinik für Haut- und Geschlechtskrankheiten Erlangen, am Landkrankenhaus Coburg und an einem Sanatorium für Stoffwechselkrankheiten in Bad Mergentheim an meiner ärztlichen Ausbildung. Die ärztliche Approbation für das Deutsche Reich erhielt ich mit dem 27. Dezember 1934.
